

7. 藥樽內或會有小量藥液剩餘，並不影響正確劑量。
8. 使用過的物品（如藥樽等）丟棄，並徹底清潔雙手。

### 注意事項

1. 只供肛門用。切勿吞服。
2. 依照醫生指示使用藥物。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 此藥物可引致嗜睡、健忘、反應遲緩及動作不協調，用後切勿駕駛及操作機械。
5. 酒精可加劇藥物的副作用，用藥後應避免飲用酒精飲品。
6. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
7. 切勿與他人共用藥物。
8. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
9. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。
10. 劑液正常呈無色透明或淡黃色，如出現異常或變色，切勿使用。
11. 須隨身攜帶，以備不時之需。
12. 藥物應存放在原裝錫紙包裝內，直至使用前才拆掉。

### 可能出現的副作用

常見的副作用包括嗜睡、頭暈、肌肉無力、意識混亂等。

副作用會較常出現於年長患者中。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚痕癢、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。


### 貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。



此病人資訊單張是由醫院管理局（醫管局）編輯而成，純粹用作一般教育和參考用途。醫管局致力確保該等資訊的準確性，但並不保證該等資訊的完整性、及時性或適用性；或不保證資訊是最為更新的。醫管局並不保證所提供的資訊符合你的健康或醫療需要。如果你有任何健康問題，應向你的醫生或藥劑師諮詢，而不應只依賴此單張所提供的資訊。


# 地西洋直腸劑液





## 什麼是地西洋直腸劑液？

地西洋是一種抗抽搐藥物，此藥物經由肛門注入，從而發揮抗抽搐作用。



## 用途

地西洋直腸劑液適用於緊急情況下控制抽搐，如持續抽搐 和小童熱痙攣（因發燒而引起的抽搐）。




## 藥理作用


地西洋直腸劑液由直腸粘膜吸收後會被迅速傳遞到大腦，並在 5 至 10 分鐘內產生藥效。

## 使用方法


1. 使用前扭開保護瓶蓋，如適用。




2. 讓患者俯伏或側臥，並將軟枕放於盤骨下。小童則可俯伏於成人膝上。




3. 將膠管慢慢地插入肛門。切勿在膠管完全插入肛門前擠壓藥樽。1 歲至 3 歲小童只需插入膠管長度的一半。



4. 在膠管插入肛門後，用手指擠壓藥樽以確保所需份量的藥物能進入體內。



5. 使用藥物時，應保持藥樽傾斜，樽咀向下。



6. 在移除膠管時保持按壓藥樽，然後將兩邊臀部緊貼片刻以防止滲漏。

