

可能出現的副作用

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚痕癢、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

忘記用藥處理方法

應儘快補用適量的劑量，若記起時已接近使用下一劑量的時間，便不必補用，只需依時使用下一劑量。

切勿使用雙倍的劑量。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。



此病人資訊單張是由醫院管理局（醫管局）編輯而成，純粹用作一般教育和參考用途。醫管局致力確保該等資訊的準確性，但並不保證該等資訊的完整性、及時性或適用性；或不保證資訊是最為更新的。醫管局並不保證所提供的資訊符合你的健康或醫療需要。如你有任何健康問題，應向你的醫生或藥劑師諮詢，而不應只依賴此單張所提供的資訊。

S/N: 024Cv5 (10/2024)

滴耳藥水



藥劑職系及服務統籌委員會
COC-Grade (Pharmaceutical Services)



醫院管理局
HOSPITAL
AUTHORITY



什麼是滴耳藥水？

滴耳藥水是藥物溶劑或懸浮劑。藥物被直接滴入耳內發揮作用。



用途

滴耳藥水一般含有殺菌或消炎成份，用於耳部感染。其他用途包括清除耳垢。

使用方法

1. 用肥皂及清水清潔雙手。
2. 如有需要，清潔耳瓣。
3. 將頭部傾側或身體側臥，耳朵向上。
4. 如用於成人及 3 歲或以上小童，將耳朵向後及向上拉，拉直耳道，以便藥水流入。



如用於 3 歲以下小童，將耳朵向後及向下拉，拉直耳道，以便藥水流入。



5. 按醫生指示的劑量，將藥水滴入耳內。避免接觸滴咀，以保持滴咀清潔。
6. 滴藥後，保持頭部傾側約兩分鐘，以防止藥水由耳朵流出。



7. 不用清洗滴咀，用畢後應立即將滴耳藥水蓋好。



如有需要，

請讓家人或他人協助使用滴耳藥水。

注意事項

1. 只供滴耳用。
2. 依照醫生指示使用藥物。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
5. 切勿使用已變色、變壞或過期的藥水。
6. 按照藥物標籤上的貯存方法，如須存放於雪櫃內，先將藥瓶握在手中數分鐘，使滴耳藥水溫度接近體溫然後使用。
7. 切勿與他人共用藥物。
8. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
9. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。