

可能出現的副作用

喉片一般副作用輕微。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚痕癢、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

忘記用藥處理方法

應儘快補用適量的劑量，若記起時已接近使用下一劑量的時間，便不必補用，只需依時使用下一劑量。

切勿使用雙倍的劑量。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。



此病人資訊單張是由醫院管理局（醫管局）編輯而成，純粹用作一般教育和參考用途。醫管局致力確保該等資訊的準確性，但並不保證該等資訊的完整性、及時性或適用性；或不保證資訊是最為更新的。醫管局並不保證所提供的資訊符合你的健康或醫療需要。如你有任何健康問題，應向你的醫生或藥劑師諮詢，而不應只依賴此單張所提供的資訊。

S/N: 030Cv5 (10/2024)

喉片（喉糖）




藥劑職系及服務統籌委員會
COC-Grade (Pharmaceutical Services)



醫院管理局
HOSPITAL
AUTHORITY

? 什麼是喉片？



喉片一般含有止痛消炎、殺菌或滋潤喉部的成份，可用於喉部疼痛、不適或感染等各種症狀。

使用方法

1. 用清水漱口。
2. 使用時請把喉片含於口中，讓藥物於口腔內溶化，發揮更佳功效。
3. 使用後請勿即時飲食或漱口。

注意事項

1. 依照醫生指示使用藥物。
2. 如果曾對藥物有過敏反應，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。
3. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
4. 切勿與他人共用藥物。
5. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
6. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。
7. 請勿咬碎或吞服喉片，以免影響藥效。
8. 多補充水份亦有助舒緩喉部的不適。
9. 喉片或含有糖份。