

可能出現的副作用

滴鼻藥水可能會在口腔留下味道。如有這種情況發生，可用清水漱口。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚痕癢、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

忘記用藥處理方法

應儘快補用適量的劑量，若記起時已接近使用下一劑量的時間，便不必補用，只需依時使用下一劑量。

切勿使用雙倍的劑量。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。



此病人資訊單張是由醫院管理局（醫管局）編輯而成，純粹用作一般教育和參考用途。醫管局致力確保該等資訊的準確性，但並不保證該等資訊的完整性、及時性或適用性；或不保證資訊是最為更新的。醫管局並不保證所提供的資訊符合你的健康或醫療需要。如你有任何健康問題，應向你的醫生或藥劑師諮詢，而不應只依賴此單張所提供的資訊。

S/N: 034Cv5 (10/2024)

滴鼻藥水



藥劑職系及服務統籌委員會
COC-Grade (Pharmaceutical Services)



醫院管理局
HOSPITAL
AUTHORITY



什麼是滴鼻藥水？

滴鼻藥水是藥物溶劑或懸浮劑。藥物被直接滴入鼻孔內，一般在鼻腔發揮作用。



用途

滴鼻藥水用於舒緩傷風感冒、慢性鼻炎和鼻敏感所引起的鼻塞等症狀。

使用方法

1. 在使用滴鼻藥水之前擤清鼻腔。



2. 用肥皂及清水清潔雙手。
3. 打開瓶蓋。

4. 坐在椅上，將頭仰後靠著椅背；或躺在床上，放枕頭在肩背下，令頭部仰後。



5. 小心將滴咀對準鼻孔，按醫生指示的劑量，將藥水滴入鼻孔。避免滴咀接觸到鼻腔內壁，以保持滴咀清潔。
6. 讓頭部保持後仰約 2 分鐘，使藥水流入鼻內。
7. 如果醫生或藥劑師建議在兩邊鼻孔使用滴鼻藥水，請在另一鼻孔重複步驟 5 至 6。
8. 不必清洗滴咀。使用後蓋回瓶蓋。
9. 完成滴鼻後清潔雙手。



使用後，

盡量避免立即打噴嚏或擤鼻。

如有需要，

請讓家人或他人協助使用滴鼻藥水。

注意事項

1. 只供滴鼻用。
2. 依照醫生指示使用藥物。請勿使用超過醫生處方之療程。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
5. 切勿與他人共用藥物。
6. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
7. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。