

注意事項

8. 一旦發現頭蝨，家庭成員及有緊密接觸者，也需要接受檢查。
9. 切勿與他人共用藥物。
10. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
11. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。

可能出現的副作用

常見的副作用包括頭皮瘙癢、紅腫、出疹、結膜炎（如與眼睛接觸）等。

若於使用藥物後皮膚受到過分刺激或出現過敏反應如皮膚敏感、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。



如有疑問，

請向你的醫生、藥劑師或有關的醫護人員

查詢。

氯菊酯（百滅寧） 藥液 1%（頭蝨用） Permethrin Liquid 1% (for Head Lice)



什麼是氯菊酯藥液



氯菊酯藥液是用來塗抹於頭髮和頭皮上，以消滅寄生在髮根上的頭蝨。



什麼是頭蝨



頭蝨是一種只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲，常見於頭髮，特別是耳背或頸後近領口的毛髮。頭蝨卵一般為白、黃、褐或灰色，表面光亮，呈橢圓形，並緊附在髮幹上，若仔細檢驗，可在患者髮根發現。病徵多為頭皮發癢。過度搔抓會令頭皮出血或損傷，增加感染的風險。

頭蝨主要是透過頭部與頭部直接接觸而傳播；亦可透過與患者共用個人物品而受感染。因此切勿與他人共用梳子、帽子、頭飾、毛巾和枕頭等個人物品。

建議保持個人衛生，並應經常徹底清潔頭髮和清洗被服及衣物。

使用方法

1. 用不含護髮素的洗髮水清洗頭髮。
2. 用水沖洗乾淨，然後用毛巾拭擦，保持頭髮少許濕潤。
3. 將頭蝨藥液搖勻並塗於頭髮上，並在頭皮上用力搓揉，以確保藥液能覆蓋所有頭髮、頭皮，應特別注意頸背及耳背部份。
4. 保留藥液在頭髮上 10 分鐘，然後用暖水沖洗，再用毛巾擦乾頭髮。
5. 用除蝨梳徹底從仍濕的髮根梳起，把依附在頭髮上的蝨及卵全部梳走。
6. 如需要重複塗搽頭蝨藥液，請依照醫生指示或藥物包裝說明使用。



注意事項

1. 只供外用。如不慎誤服，請立即求醫。
2. 依照醫生指示使用藥物。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
5. 塗抹頭蝨藥液時，宜先戴上即棄手套，以免皮膚受到刺激。使用頭蝨藥液後，應清洗雙手。
6. 切勿讓頭蝨藥液沾及眼睛。如不慎入眼，應立即以大量清水沖洗。如有需要，請立即求醫。
7. 患者在療程前使用過的帽子、毛巾、枕袋、床單和被服等必須與其他家人的物品分隔清洗，並應以攝氏 60 度或以上熱水洗濯不少於 20 分鐘，方可再用。梳頭用具或不耐熱物品可用 1:1 漂白水浸 30 分鐘。