

如藥物出現以下情況，  
切勿服用 / 使用



已過期的藥物。




已變質的藥物（如變色、變味或變得混濁）。



如非特別註明，已開封一個月的眼藥水、眼藥膏及眼用凝膠。



藥物的標籤模糊不清。



如遇上上述情況，便不適宜再使用該藥物。應立刻把藥物丟棄，以避免日後錯誤使用。

## 藥物的丟棄方法




定期檢查藥物的有效 / 配藥日期，過期或完成療程後剩餘之藥物可當作一般家居垃圾處理。



# 藥物存放要留神 服用安全又安心

## 存放藥物須知



不適當存放藥物，是導致意外誤服的主因，  
不但有損健康，甚至危害生命。  
為確保你和家人的安全，請妥善存放藥物。



藥劑職系及服務統籌委員會  
COC-Grade (Pharmaceutical Services)



醫院管理局  
HOSPITAL  
AUTHORITY

## 藥物的存放方法

藥物應存放在陰涼及乾爽的地方，避免直接受熱及光線照射。藥物一般只須存放於室溫，但有些藥物必須存放在雪櫃內。這些需要冷藏的藥物，在標籤上都有特別註明，請按照標籤或產品說明書指示存放。




如藥物被配發於透光的藥袋或容器內，請避光貯存，例如存放於抽屜或儲物櫃內。

切勿把藥物存放於浴室或廚房，因為這些地方相對溫暖和潮濕，容易導致藥物變質。



藥物應存放在孩童不能觸及的地方，以免孩童誤服。

除使用按次分配藥盒外，藥物應存放於原裝的容器內，而且同一容器內只應存放一種藥物。



內服及外用的藥物應分開存放。



自己與其他家人的藥物應分開存放，減少混淆弄錯，避免誤服他人的藥物。

即使症狀相似，切勿與他人共用藥物。不當使用藥物可能會導致嚴重不良反應。

食物及藥物應分開存放。

應保留原裝容器或藥袋上的藥物標籤，並注意標籤上的資料，包括藥物名稱、劑量、注意事項、以及有效 / 配藥日期等，以免混淆及誤服。

請勿把藥物留在車上，車廂內的溫度差異很大，會影響藥物的品質。

乘飛機時，建議把藥物存放於手提行李，因為：

- 旅途中仍可使用藥物。
- 如不幸遺失寄倉行李，也不會失去藥物。
- 寄倉行李存放環境的溫度差異很大，並不適合存放藥物。

乘飛機時，如存放於手提行李內的液體、凝膠和噴霧狀藥物需要盛載在容量超過 100 毫升的容器內，請向機場保安檢查人員出示，以便進行保安檢查。檢查時亦可能需要出示有關藥物的證明，例如醫生信、處方證明或印有乘客姓名的藥物標籤。詳情請向航空公司或民航處查詢。