

可能出現的副作用

部份病人使用高錳酸鉀藥液後，皮膚可能會出現輕微不適。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚敏感、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

忘記用藥處理方法

應儘快補用適量的劑量，若記起時已接近使用下一劑量的時間，便不必補用，只需依時使用下一劑量。

切勿使用雙倍的劑量。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。



此病人資訊單張是由醫院管理局（醫管局）編輯而成，純粹用作一般教育和參考用途。醫管局致力確保該等資訊的準確性，但並不保證該等資訊的完整性、及時性或適用性；或不保證資訊是最為更新的。醫管局並不保證所提供的資訊符合你的健康或醫療需要。如你有任何健康問題，應向你的醫生或藥劑師諮詢，而不應只依賴此單張所提供的資訊。

S/N: 040Cv5 (10/2024)

高錳酸鉀 (灰錳氧) 藥液 4%



藥劑職系及服務統籌委員會
COC-Grade (Pharmaceutical Services)



什麼是高錳酸鉀藥液？

高錳酸鉀藥液是具有殺菌作用的外用藥水，通常用於坐浴或浸洗，對患處有收斂、清潔及消毒作用。



注意事項

1. 依照醫生指示使用藥物。
2. 如果曾對藥物有過敏反應，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。
3. 藥液只供外用，不可內服，亦應避免接觸眼睛、鼻、口或敏感的位置。若不慎濺到上述部位，應立即用清水沖洗。如有不適，應儘快求醫。
4. 藥液必須按指示稀釋後方可使用，未經稀釋的藥液可灼傷皮膚。
5. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
6. 切勿與他人共用藥物。
7. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
8. 此藥液可令衣物、皮膚、指甲或毛髮染色。
9. 用藥後如果徵狀持續或惡化，應立即求醫。
10. 用後切記緊扭緊瓶蓋。

使用方法

1. 首先清潔雙手。
2. 藥液必須按指示稀釋後方可使用。除非醫生另有指示，將 2 公升溫水及 5 毫升的高錳酸鉀藥液 4% 加入適合用作浸洗的容器內，然後攪拌均勻。稀釋後的藥液應為粉紅色或粉紫色。
3. 在已稀釋的藥液內浸泡患處約 10 分鐘，再用毛巾抹乾。