

注意事項

8. 一旦發現頭蝨，患者的家庭成員及其緊密接觸者，也均需求醫接受檢查。
9. 藥液含有易燃物質，保持藥液及被藥液濕透的頭髮遠離熱源，例如熱吹風機。
10. 切勿與他人共用藥物。
11. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
12. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。

可能出現的副作用

常見的副作用包括頭皮痕癢、紅腫、出疹、結膜炎（如與眼睛接觸）等。

若於使用藥物後皮膚受到過分刺激或出現過敏反應如皮膚痕癢、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。



此病人資訊單張是由醫院管理局（醫管局）編輯而成，純粹用作一般教育和參考用途。醫管局致力確保該等資訊的準確性，但並不保證該等資訊的完整性、及時性或適用性；或不保證資訊是最為更新的。醫管局並不保證所提供的資訊符合你的健康或醫療需要。如你有任何健康問題，應向你的醫生或藥劑師諮詢，而不應只依賴此單張所提供的資訊。

馬拉硫磷藥液 0.5% (頭蝨用)



藥劑職系及服務統籌委員會
COC-Grade (Pharmaceutical Services)

什麼是馬拉硫磷藥液



馬拉硫磷藥液是用來塗抹於頭髮和頭皮上，以消滅寄生在髮根上的頭蝨及其卵子。



什麼是頭蝨



頭蝨是一種只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲，常見於頭髮，特別是耳背或頸後近領口的毛髮。頭蝨卵一般為白、黃、褐或灰色，表面光亮，呈橢圓形，並緊附在髮幹上，若仔細檢驗，可在患者髮根發現。病徵多為頭皮痕癢。過度搔抓或會令頭皮出血或損傷，增加皮膚感染的風險。

頭蝨主要是透過頭部與受感染者的頭部直接接觸而傳播；亦可透過與患者共用個人物品而受感染。因此切勿與他人共用梳子、帽子、頭飾、毛巾和枕頭等個人物品。

建議保持個人衛生，並應經常徹底清潔頭髮和清洗床上用品及衣物。

使用方法

1. 將頭蝨藥液搖勻，無需預先弄濕頭髮，充份塗搽並在頭髮和頭皮上搓揉，直至完全濕透，應特別注意髮根、後頸、兩邊髮鬢、瀏海及耳背等地方。
2. 塗搽藥液後，避免遮蓋頭髮，讓頭髮自然風乾，並讓頭蝨藥水在頭髮上停留 12 小時。可考慮在睡前使用，用毛巾蓋住枕頭，以防止藥液染污枕頭。
3. 12 小時後，用不含護髮素的洗髮水清洗頭髮。
4. 用除蝨梳徹底從仍濕的髮根梳起，把依附在頭髮上的蝨及卵全部梳走。
5. 然後可照常把頭髮吹乾。
6. 治療後的 2-3 週內，每 2-3 天使用除蝨梳檢查頭髮是否仍有活蝨，直至確定再沒有頭蝨為止。
7. 如需要重複塗搽頭蝨藥液，請依照醫生指示或藥物包裝說明使用。



注意事項

1. 只供外用。如不慎誤服，請立即求醫。
2. 依照醫生指示使用藥物。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
5. 塗抹頭蝨藥液時，宜先戴上即棄手套，以免皮膚受到刺激。使用頭蝨藥液後，應清洗雙手。
6. 切勿讓頭蝨藥液沾及眼睛。如不慎入眼，應立即以大量清水沖洗。如有需要，請立即求醫。
7. 患者在療程前使用過的帽子、毛巾、枕袋、被褥和衣服等必須與其他家人或院友的物品分開清洗，並應以攝氏 60 度或以上熱水洗濯不少於 10 分鐘，方可再用。梳頭用具或不耐熱物品可用 1:1 稀釋漂白水浸 30 分鐘。難以清洗的物品，如枕頭、床褥等，可放入膠袋後密封最少 14 日，才如常使用。