

注意事項

6. 由於疥瘡的潛伏期可達數星期，患者各家庭成員及護理員亦應求醫接受檢查。
7. 即使成功清除疥瘡，痕癢仍可能持續4星期。但如果病徵持續或皮膚出現其他變化，應立即求醫。
8. 避免接觸眼睛。如乳劑不慎入眼，應立即以大量清水沖洗。如有需要，請立即求醫。
9. 請勿在熱水沐浴後立即使用乳劑。
10. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
11. 切勿與他人共用藥物。
12. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
13. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。
14. 除醫生特別指示外（例如病情較嚴重的挪威型疥瘡或結痂型疥瘡），或在一般情況下，塗敷乳劑一次便已足夠。

可能出現的副作用

常見的副作用包括瘙癢、皮膚紅腫或刺痛、接觸性皮炎等。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚敏感、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

忘記用藥處理方法

應儘快補用適當的劑量，如持續有疥瘡徵狀應及早求醫。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。



如有疑問，
請向你的醫生、藥劑師或有關的醫護人員
查詢。

S/N: 038Cv3 (10/2019)

氯菊酯(百滅寧) 乳劑5% (疥瘡用) Permethrin Lotion 5% (for Scabies)



藥劑職系及服務統籌委員會
COC-Grade (Pharmaceutical Services)





什麼是氯菊酯乳劑？

氯菊酯乳劑是用於皮膚以治療疥瘡的外用藥物。



什麼是疥瘡？

疥瘡是疥蟎蟲引起的皮膚病。疥蟎是一種寄生蟲，會鑽入人體皮膚寄居及繁殖。疥瘡通常透過直接接觸患者的皮膚而傳播。患者的衣物和被褥亦可能帶有疥蟎及蟲卵，繼而傳播此病。在家庭成員之間和院舍機構內傳播亦很常見。

患者會感到非常痕癢，在晚間或沐浴後尤為嚴重。受影響的部位包括手指罅隙的皮膚、手腕、肘部、腋窩、乳頭、下腹、外生殖器官、臀部及腹股溝等部位的皮膚褶。皮膚表面可能會出現紅疹、線狀損痕或小水泡；面部及頭皮一般不受影響。

使用方法

1. 於晚上使用，先以溫水沐浴，再抹乾全身。
2. 將乳劑搖勻。
3. 將乳劑由頸部開始往下，塗遍全身，尤其是皮膚摺疊位置，例如手指、腳趾縫間、腋下及腹股溝。避免接觸傷口及敏感部位。
4. 如疥瘡伸延至頸部以上，則可將乳劑塗遍全身，並包括頭皮、面部及雙耳。避免接觸眼睛。
5. 待乳劑乾後，穿上清潔衣服，毋須洗手。
6. 待 8 至 14 小時後，用溫水及肥皂徹底沖淨乳劑，並用毛巾抹乾及換上清潔衣服。



如有需要，

請讓家人或他人協助使用乳劑。
協助他人使用時，應先戴上即棄手套。

注意事項

1. 只供外用。如有需要，可用排筆協助塗藥。
2. 依照醫生指示使用藥物。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 使用乳劑治療期間，每次洗手後必需重塗乳劑。
5. 患者的衣物、床單、被鋪、枕袋等須與其他家人或院友的物品分開清洗，並應以攝氏 60 度或以上的熱水洗濯不少於 10 分鐘，以消滅疥蟎蟲及其蟲卵。難以清洗的物品，如鞋、床褥等，可放入膠袋後密封最少 14 日，才如常使用。

攝氏 **60°** 或以上

不少於

10 分鐘



最少 **14** 天