

可能出現的副作用

部份漱口藥水可能會引致味覺異常或使牙齒表面染色。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚敏感、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

忘記用藥處理方法

應儘快補用適量的劑量，若記起時已接近使用下一劑量的時間，便不必補用，只需依時使用下一劑量。

切勿使用雙倍的劑量。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。




如有疑問，

請向你的醫生、藥劑師或有關的醫護人員

查詢。

S/N: 032Cv3 (10/2019)

漱口藥水



藥劑職系及服務統籌委員會
COC-Grade (Pharmaceutical Services)



醫院管理局
HOSPITAL
AUTHORITY



什麼是漱口藥水？

漱口藥水是一種在口腔黏膜或咽喉發揮效用的藥物。



用途

漱口藥水的主要用途有：

- 牙齦炎
- 咽喉炎
- 口腔黏膜炎



藥理作用

漱口藥水的藥理作用要視乎內含成份而定。含消毒成份的漱口藥水可抑制口腔細菌生長；而含有止痛和消炎成份的漱口藥水，則可舒緩口腔內的痛楚和發炎。

使用方法


1. 用水清潔口腔。
2. 按醫生指示使用適量的漱口藥水。請注意部份漱口藥水使用前需要用清水稀釋。請先詳細閱讀藥物標籤上的說明，並依指示稀釋漱口藥水。
3. 將漱口藥水漱遍口腔一會，由於不同的漱口藥水有不同的建議漱口時間，請參照產品說明或向藥劑師查詢。



4. 完成後將漱口藥水吐出。
5. 用後請勿即時飲食或漱口。

注意事項

1. 只供漱口用，切勿吞服。如不慎吞下而感到身體不適，請儘快求醫。
2. 依照醫生指示使用藥物。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
5. 切勿與他人共用藥物。
6. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。



7. 嬰兒不應使用漱口藥水。
8. 為避免不慎吞下的風險，6歲以下兒童應在家長的監督下使用漱口藥水。
9. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。