

注意事項

1. 只供灌腸用。請勿吞服或用於陰道。
2. 依照醫生指示使用藥物。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 如有噁心、嘔吐或腹痛，不宜使用灌腸劑。
5. 使用後，如發現直腸出血，請立即求醫。
6. 切勿強行將瓶嘴插入直腸，以免引致損傷。
7. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
8. 切勿與他人共用藥物。
9. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
10. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。

可能出現的副作用

常見的副作用包括：直腸疼痛和刺激反應。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚敏感、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

忘記用藥處理方法

應儘快補用適量的劑量，若記起時已接近使用下一劑量的時間，便不必補用，只需依時使用下一劑量。

切勿使用雙倍的劑量。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。



如有疑問，
請向你的醫生、藥劑師或有關的醫護人員
查詢。

灌腸劑



藥劑職系及服務統籌委員會
COC-Grade (Pharmaceutical Services)



什麼是灌腸劑？

灌腸劑是一種通過直腸注入藥物的藥液。



用途

灌腸劑的主要用途為：

1. 幫助通便
2. 在腸道檢查前灌洗腸道
3. 用作治療腸炎等




藥理作用

灌腸劑會因應其成份而有不同的藥理作用。例如用作通便的灌腸劑，能潤滑並刺激腸壁，軟化大便，使之易於排出。有些灌腸劑則有消炎的作用。

使用方法

1. 徹底清潔雙手，如有需要，可戴上即棄手套。
2. 先搖勻灌腸劑。
3. 除去灌腸劑的保護瓶蓋（如適用）。
4. 向左側臥，左腳伸直、右腳朝胸部彎曲以平衡身體，平放雙臂。

左邊姿勢



或者

跪下，頭與胸向前低垂，直至左臉貼到平面上，同時將左臂舒適地彎曲。

膝、胸姿勢



5. 把瓶嘴朝著肚臍方向，輕輕插入直腸。如果這種插入方法引起疼痛或不適，可於使用前以潤滑劑擦在瓶嘴上。
6. 緊握藥瓶。除另有指示，慢慢地擠壓藥瓶直至將所有液體灌入直腸內。
7. 將已擠壓的藥瓶拔出。
8. 按指示保持灌藥時的姿勢，以便藥液分佈於腸道內。
9. 把使用過的物品（如藥瓶、手套等）丟棄，並徹底清潔雙手。



如有需要，

請讓家人或他人協助使用灌腸劑。