

注意事項

5. 由於疥瘡的潛伏期可達數星期，患者各家庭成員及護理員亦應接受檢查。
6. 即使成功清除疥瘡，痕癢仍可能持續 4 星期。但如果病徵持續或皮膚出現其他變化，應立即求醫。
7. 避免接觸眼睛。如乳劑不慎入眼，應立即以大量清水沖洗。如有需要，請立即求醫。
8. 請勿在熱水沐浴後立即使用乳劑。
9. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
10. 切勿與他人共用藥物。
11. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
12. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。

可能出現的副作用

常見的副作用包括痕癢、皮膚紅腫、接觸性皮炎等。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚痕癢、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

忘記用藥處理方法

應儘快補用適當的劑量，若記起時已與上一劑量的時間距離太久，療效會受影響，如持續有疥瘡徵狀應及早求醫。


貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。



此病人資訊單張是由醫院管理局（醫管局）編輯而成，純粹用作一般教育和參考用途。醫管局致力確保該等資訊的準確性，但並不保證該等資訊的完整性、及時性或適用性；或不保證資訊是最為更新的。醫管局並不保證所提供的資訊符合你的健康或醫療需要。如果你有任何健康問題，應向你的醫生或藥劑師諮詢，而不應只依賴此單張所提供的資訊。

苯甲酸苄酯乳劑 (疥瘡用)



藥劑職系及服務統籌委員會
COC-Grade (Pharmaceutical Services)



醫院管理局
HOSPITAL
AUTHORITY

什麼是苯甲酸苄酯乳劑？



苯甲酸苄酯乳劑是用於皮膚以治療疥瘡的外用藥物。



什麼是疥瘡？



疥瘡是疥蟎蟲引起的皮膚病。疥蟎是一種寄生蟲，會鑽入人體皮膚寄居及繁殖。疥瘡通常透過直接接觸患者的皮膚而傳播。患者的衣物和被褥亦可能帶有疥蟎及蟲卵，繼而傳播此病。在家庭成員之間和院舍機構內傳播亦很常見。

患者會感到非常痕癢，在晚間或沐浴後尤為嚴重。受影響的部位包括手指罅隙的皮膚、手腕、肘部、腋窩、乳頭、下腹、外生殖器官、臀部及腹股溝等部位的皮膚褶。皮膚表面可能會出現紅疹、線狀損痕或小水泡；面部及頭皮一般不受影響。

使用方法

1. 於晚上使用，先以溫水沐浴，再抹乾全身。
2. 將乳劑搖勻。
3. 將乳劑由頸部開始往下，塗遍全身，尤其是皮膚摺疊位置，例如手指、腳趾縫間、腋下及腹股溝。避免接觸傷口及敏感部位。如有需要，可用排筆協助塗藥。
4. 如疥瘡伸延至頸部以上，則可將乳劑塗遍全身，並包括頭皮、面部及雙耳外部皮膚。避免接觸眼睛。
5. 待乳劑乾透後（約需 10 分鐘），穿上清潔衣服，毋須洗手。
6. 第二天重複塗上乳劑一次，但毋須沐浴或更換清潔衣服。
7. 在第二次使用乳劑的二十四小時後，可用溫水及肥皂徹底沖淨乳劑，並用清潔毛巾抹乾及換上清潔衣服。
8. 如有需要，可以按醫生指示塗上第三次乳劑。
9. 不同供應商所提供的藥物使用方法可能有所不同。請依照藥物包裝說明或醫生指示使用。



如有需要，

請讓家人或他人協助使用乳劑。協助他人使用時，應先戴上即棄手套。

注意事項

- 1 只供外用。如不慎誤服，請立即求醫。
- 2 如果曾對藥物有過敏反應，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。
- 3 使用乳劑治療期間，每次沖洗過的位置都必需重塗乳劑。
- 4 患者的衣物、床單、被鋪、枕袋等必須與其他家人或院友的物品分開清洗，並應以攝氏 60 度或以上的熱水洗滌不少於 10 分鐘，以消滅疥蟎蟲及其蟲卵。難以清洗的物品，如鞋、床褥等，可放入膠袋後密封最少 7 日，才如常使用。

攝氏 **60°** 或以上

不少於
10 分鐘



最少 **7** 日

