

# 乳化軟膏

## 可能出現的副作用

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚痕癢、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

## 忘記用藥處理方法

應儘快補用適量的劑量，若記起時已接近使用下一劑量的時間，便不必補用，只需依時使用下一劑量。


切勿使用雙倍的劑量。

## 貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。



此病人資訊單張是由醫院管理局（醫管局）編輯而成，純粹用作一般教育和參考用途。醫管局致力確保該等資訊的準確性，但並不保證該等資訊的完整性、及時性或適用性；或不保證資訊是最為更新的。醫管局並不保證所提供的資訊符合你的健康或醫療需要。如果你有任何健康問題，應向你的醫生或藥劑師諮詢，而不應只依賴此單張所提供的資訊。



S/N: 025Cv5 (10/2024)

藥劑職系及服務統籌委員會  
COC-Grade (Pharmaceutical Services)



醫院管理局  
HOSPITAL  
AUTHORITY

## ? 什麼是乳化軟膏？

乳化軟膏是一種石蠟類的外用藥物，用作預防或舒緩皮膚乾燥。



## ! 用途

1. 代替肥皂
2. 作潤膚用

## ⚙️ 藥理作用

乳化軟膏可作肥皂使用，預防皮膚乾燥；也可減少水分從皮膚流失，滋潤皮膚。

## 使用方法

### 代替肥皂

1. 先弄濕身體。
2. 直接塗抹或把軟膏加上少量溫水，並於手心搓揉，然後搽上全身（面部及頭皮除外）。
3. 最後用水清洗，在身上留下一層薄薄的軟膏為佳。

### 作潤膚用

依照醫生指示塗在皮膚上，不必清洗。在沐浴後 5 至 10 分鐘內使用效果更佳。

## 注意事項

1. 只供外用，應避免讓軟膏接觸眼睛。
2. 依照醫生指示使用藥物。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
5. 切勿與他人共用藥物。
6. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
7. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。
8. 如在浴缸使用，請徹底清理浴缸內殘餘的軟膏，慎防滑倒。
9. 染有軟膏的衣物及敷料比較易燃，請遠離火種，並切勿吸煙。