

## 可能出現的副作用

結膜炎/眼部刺激

如何處理?

- 如出現眼睛不適或視力改變，應從速求醫。

罕見但致命的副作用 (如間質性肺病)

如何處理?

- 若在服藥期間出現突發的呼吸困難、氣促、咳嗽或發燒，應從速求醫。

若副作用反應持續或惡化，請儘快聯絡醫生。  
若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚敏感、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

## 潛在的藥物相互作用

1. 如正在服用其他藥物，請告知醫生和藥劑師。
2. 有些藥物會與吉非替尼產生相互作用，尤其是：
  - 抗真菌藥，例如 ketoconazole、itraconazole 和 voriconazole
  - 抗生素，例如 clarithromycin、erythromycin
  - 抗愛滋病藥，例如 ritonavir
  - 抗腦癇藥，例如 carbamazepine、phenytoin 和 phenobarbitone
  - 抗結核菌藥，例如 rifampicin
  - 抗凝血藥，例如 warfarin
  - 胃藥，例如 pantoprazole、famotidine 和 aluminium / magnesium hydroxide
  - 草本藥物貫葉連翹

## 忘記用藥處理方法

- 如距離原定用藥的時間少於 12 小時，請儘快補服，並依照原定時間服用下一劑量。
- 如距離原定用藥的時間超過 12 小時，切勿補服，只需按照平常的用藥時間服用下一劑量。
- 切勿使用雙倍的劑量。
- 於覆診時，向醫生告知任何錯過的劑量。

## 貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。

如有疑問，請向你的醫生、藥劑師或護士查詢。

# 口服標靶藥物

## 病人須知

## 吉非替尼

## Gefitinib



# 什麼是吉非替尼?

吉非替尼是一種針對癌細胞的口服標靶藥物。

表皮生長因子受體促進癌細胞的生長和擴散，吉非替尼透過抑制癌細胞上的表皮生長因子受體(EGFR)，中斷訊息傳遞，從而阻止癌細胞生長。

## 用途

吉非替尼主要用於表皮生長因子受體(EGFR)突變呈陽性的非小型細胞肺癌(non-small cell lung cancer, NSCLC)。

## 使用方法

請依照醫生指示服用此藥。

- 請於每天固定時間服藥。
- 可空腹或於用餐前或用餐後服用。
- 如需服用胃藥，請先向醫生或藥劑師查詢。
- 療程期間請勿服用西柚和西柚汁。

## 注意事項

1. 依照醫生指示使用藥物。
2. 如果曾對藥物有過敏反應，請先向醫生或藥劑師查詢。
3. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
4. 切勿與他人共用藥物。
5. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前

請先告知醫生和藥劑師。服藥期間切勿餵哺母乳。

6. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。
7. 懷孕婦女請勿觸摸藥物。
8. 觸摸藥物後請洗手。
9. 如需在治療過程中使用非處方藥物、中藥、草藥或接種疫苗，請先向醫生或藥劑師查詢。
10. 療程期間，可維持正常的性生活，但建議採用障礙性的避孕方法（如安全套）。若懷疑懷孕，請即通知醫生。

## 可能出現的副作用及處理方法

可能出現的副作用	
皮疹、皮膚乾燥、痕癢	如何處理? <ul style="list-style-type: none"> <li>● 穿着鬆身、棉質衣物。</li> <li>● 使用保濕潤膚膏、潤膚霜。</li> <li>● 避免被陽光直接照射，外出時可使用防曬霜或戴帽。</li> </ul>
肚瀉	如何處理? <ul style="list-style-type: none"> <li>● 多飲流質，注意補充水份。</li> <li>● 避免進食肥膩、辛辣、奶類製品和高纖維食物(如水果、蔬菜、麥包、消化餅)。</li> <li>● 需要時按指示服食醫生處方的止瀉藥。</li> </ul>

噁心、嘔吐及減低食慾	如何處理? <ul style="list-style-type: none"> <li>● 少食多餐，保持均衡的營養飲食。</li> <li>● 避免味道太濃的食物。</li> <li>● 多飲流質，注意補充水份。</li> <li>● 需要時服食醫生處方的止嘔藥。</li> </ul>
疲倦	如何處理? <ul style="list-style-type: none"> <li>● 避免駕駛或操作機器。</li> <li>● 均衡作息。</li> </ul>
在血液測試中的肝臟酵素過高	如何處理? <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果你的肝臟酵素過高，你的醫生可能會告訴你停止服用此藥。</li> <li>● 如果你有肝臟問題的跡象，如眼睛或皮膚變黃，請立即求醫。</li> </ul>
口腔潰損	如何處理? <ul style="list-style-type: none"> <li>● 不要飲酒及避免進食刺激性的食物如辛辣或過酸的食物。</li> <li>● 經常使用鹽水或按照醫生指示使用處方的漱口水漱口。</li> </ul>