

## 可能出現的副作用

### 增加流血風險

#### 如何處理？

- 避免令身體受傷。
- 保持大便暢通。
- 使用軟毛牙刷刷牙，從而減少流牙血的機會。
- 如有原因不明的瘀傷或流血，如流鼻血、流牙血、皮膚上出現血點或紅疹、吐血、大小便帶血，請儘快聯絡醫生。

### 頭痛、肌肉痙攣、疼痛

#### 如何處理？

- 頭痛或肌肉疼痛通常可以使用止痛藥來緩解。如有需要，請向你的醫生或藥劑師查詢使用合適的止痛藥。

若副作用反應持續或惡化，請儘快聯絡醫生。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚敏感、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

## 潛在的藥物相互作用

1. 如正在服用其他藥物，請先告知醫生或藥劑師。
2. 有些藥物會與伊馬替尼產生相互作用，尤其是：
  - 抗真菌藥，例如 ketoconazole、itraconazole 和 voriconazole
  - 抗生素，例如 clarithromycin、erythromycin
  - 抗愛滋病藥，例如 ritonavir
  - 抗腦癇藥，例如 carbamazepine、phenytoin 和 phenobarbitone
  - 抗結核菌藥，例如 rifampicin
  - 抗凝血藥，例如 warfarin、apixaban
  - 草本藥物貫葉連翹

## 忘記用藥處理方法

- 如你服用伊馬替尼的劑量為每日一次，可於原定用藥時間的 12 小時內補服。
- 如你服用伊馬替尼的劑量為每日兩次，可於原定用藥時間的六小時內補服。
- 否則，切勿補服，只需按照平常的用藥時間服用下一劑量。
- 切勿使用雙倍的劑量。
- 於覆診時，向醫生告知任何錯過的劑量。

## 貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。

如有疑問，請向你的醫生、藥劑師或護士查詢。

# 口服標靶藥物

## 病人須知

# 伊馬替尼

# Imatinib



# 什麼是伊馬替尼？

伊馬替尼屬於口服導向治療(或稱標靶治療)·它是透過抑制癌細胞中獨有的蛋白酶(統稱為酪氨酸激酶 tyrosine kinase)從而阻止癌細胞生長，並導致它們死亡。

## 用途

伊馬替尼主要用於慢性粒細胞白血病(chronic myeloid leukaemia, CML)、急性淋巴細胞白血病(acute lymphoblastic leukaemia, ALL)和胃腸道間質瘤(gastrointestinal stromal tumour, GIST)。

## 使用方法

醫生會根據你的狀況處方合適的劑量。你必須依從醫生的指示服用伊馬替尼。

- 進餐時，以大杯清水服用可減輕腸胃副作用。
- 請於每天相同時間服用
- 治療期間，避免食用西柚或飲用西柚汁

## 注意事項

1. 依照醫生指示使用藥物。
2. 如果曾對藥物有過敏反應，請先向醫生或藥劑師查詢。
3. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
4. 切勿與他人共用藥物。
5. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。服藥期間及停藥後

- 一個月內切勿餵哺母乳。
6. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。
  7. 懷孕婦女請勿觸摸藥物。
  8. 觸摸藥物後請洗淨雙手。
  9. 如需在治療過程中使用非處方藥物、中藥、草藥或接種疫苗，請先向醫生或藥劑師查詢。
  10. 療程期間，可維持正常的性生活，但建議採用障礙性的避孕方法(如安全套)。若懷疑懷孕，請即通知醫生。

## 可能出現的副作用及處理方法

可能出現的副作用
<p>增加感染風險</p> <p>如何處理?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 勤洗手，保持個人衛生。</li> <li>● 避免到人煙稠密的地方及親近有傳染病的人。</li> <li>● 避免進食未經煮熟的食物。</li> <li>● 如有發燒(口探體溫達攝氏 38 度/華氏 100 度)、發冷、咳嗽、小便疼痛等感染症狀，請立即求醫。</li> </ul>
<p>皮疹，痕癢</p> <p>如何處理?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 穿着鬆身、棉質衣物。</li> <li>● 使用保濕潤膚膏、潤膚霜。</li> <li>● 避免被陽光直接照射，外出時可使用防曬霜或戴帽。</li> </ul>

<p>噁心、嘔吐及減低食慾</p> <p>如何處理?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 少食多餐，保持均衡的營養飲食。</li> <li>● 避免味道太濃的食物。</li> <li>● 多飲流質，注意補充水份。</li> <li>● 需要時服食醫生處方的止嘔藥。</li> </ul>
<p>疲倦</p> <p>如何處理?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 避免駕駛或操作機器。</li> <li>● 均衡作息。</li> </ul>
<p>肚瀉</p> <p>如何處理?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 多飲流質，注意補充水份。</li> <li>● 避免進食肥膩、辛辣、奶類製品和高纖維食物(如水果、蔬菜、麥包、消化餅)。</li> <li>● 需要時按指示服食醫生處方的止瀉藥。</li> </ul>
<p>水腫(腳腫及面部浮腫等)</p> <p>如何處理?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果你的體重原因不明地迅速增加，請通知你的醫生。</li> <li>● 如果你的腳或小腿有浮腫: 坐著時可嘗試抬高腿部，及避免穿著緊身衣服。</li> <li>● 如果症狀加重，醫生可能會處方利尿劑，以幫助改善你的情況。</li> </ul>