

可能出現的副作用

皮疹、皮膚乾燥、痕癢

如何處理？

- 穿着鬆身、棉質衣物。
- 使用保濕潤膚膏、潤膚霜。
- 避免被陽光直接照射，外出時可使用防曬霜或戴帽。

肌肉疼痛

如何處理？

- 適當舒展運動，避免過份操勞。

疲倦

如何處理？

- 避免駕駛或操作機器。
- 均衡作息。

其他常見的副作用包括頭痛、咳嗽等。

若副作用反應持續或惡化，請儘快聯絡醫生。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚敏感、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

潛在的藥物相互作用

1. 如正在服用其他藥物，請先告知醫生或藥劑師。
2. 有些藥物會與尼洛替尼產生相互作用，尤其是：
 - 抗真菌藥，例如 ketoconazole、itraconazole 和 voriconazole
 - 抗生素，例如 clarithromycin、erythromycin
 - 抗愛滋病藥，例如 ritonavir
 - 抗腦癇藥，例如 phenytoin、carbamazepine 和 phenobarbitone
 - 抗結核菌藥，例如 rifampicin
 - 胃藥，例如 pantoprazole、famotidine 和 aluminium / magnesium hydroxide
 - 草本藥物貫葉連翹

忘記用藥處理方法

- 如距離原定用藥的時間少於六小時，請儘快補服，並依照原定時間服用下一劑量。
- 如距離原定用藥的時間超過六小時，切勿補服，只需按照平常的用藥時間服用下一劑量。
- 切勿使用雙倍的劑量。
- 於覆診時，向醫生告知任何錯過的劑量。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。

如有疑問，請向你的醫生、藥劑師或護士查詢。

口服標靶藥物 病人須知

尼洛替尼 Nilotinib

什麼是尼洛替尼?

尼洛替尼屬於口服導向治療(或稱標靶治療) · 尼洛替尼是透過抑制癌細胞中獨有的蛋白酶(統稱為酪氨酸激酶 tyrosine kinase)從而阻止癌細胞生長 · 並導致它們死亡。

大部份(90-95%) 慢性粒細胞白血病 (chronic myeloid leukaemia, CML) 病人的染色體出現病變 · 產生異常的「費城染色體」(Philadelphia chromosome)。「費城染色體」製造結構及功能反常的蛋白酶令白血球細胞不正常生長而引致 CML。尼洛替尼能抑制「費城染色體」發出錯誤信息 · 遏止不正常白血球的產生。

用途

尼洛替尼主要用於慢性粒細胞白血病 (CML)。

使用方法

- 請於每天早、晚服用 · 最好相隔 12 小時；請於餐前一小時或餐後兩小時服用。
- 請用水吞服整粒藥物。
- 在服用尼洛替尼的兩個小時前至兩個小時後 · 請勿服用中和胃酸藥。

- 如需服用胃藥如 famotidine · 請先向醫生或藥劑師查詢。
- 治療期間 · 避免食用西柚或飲用西柚汁。
- 請將出現的副作用告訴醫生。醫生可能會根據出現的副作用改變藥物的劑量。

注意事項

1. 依照醫生指示使用藥物。
2. 如果曾對藥物有過敏反應 · 請先向醫生或藥劑師查詢。
3. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
4. 切勿與他人共用藥物。
5. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。服藥期間及停藥後 14 日內 切勿餵哺母乳。
6. 用藥後如果情況持續或惡化 · 應立即求醫。
7. 懷孕婦女請勿觸摸藥物。
8. 觸摸藥物後請洗手。
9. 如需在治療過程中使用非處方藥物、中藥、草藥或接種疫苗 · 請先向醫生或藥劑師查詢。
10. 療程期間 · 可維持正常的性生活 · 但建議採用障礙性的避孕方法 (如安全套)。若懷疑懷孕 · 請即通知醫生。

可能出現的副作用及處理方法

可能出現的副作用

增加感染風險

如何處理?

- 勤洗手 · 保持個人衛生。
- 避免到人煙稠密的地方及親近有傳染病的人。
- 避免進食未經煮熟的食物。
- 如有發燒(口探體溫達攝氏 38 度/華氏 100 度)、發冷、咳嗽、小便疼痛等感染症狀 · 請立即求醫。

噁心、嘔吐及減低食慾

如何處理?

- 少食多餐 · 保持均衡的營養飲食。
- 避免味道太濃的食物。
- 多飲流質 · 注意補充水份。
- 需要時服食醫生處方的止嘔藥。

肚瀉

如何處理?

- 多飲流質 · 注意補充水份。
- 避免進食肥膩、辛辣、奶類製品和高纖維食物(如水果、蔬菜、麥包、消化餅)。
- 需要時按指示服食醫生處方的止瀉藥。