

藥劑師教你認識正確的用藥觀念

❌ 使用降膽固醇藥後便不必再控制飲食、運動及保持適當體重。

✅ 藥物雖然可以幫助降低膽固醇，但不斷地從食物中吸收過量的膽固醇會嚴重影響對病情的控制。因此，要有效地減低膽固醇積聚，必須要長期定時用藥，並保持健康的飲食習慣、控制體重和定時做適量運動。

❌ 害怕藥物的副作用，不肯用藥。

✅ 不是每個人用藥後都會出現副作用，而副作用的嚴重程度亦因人而異，毋須過份擔心。如因害怕藥物的副作用而擅自更改劑量或停藥，有機會令病情惡化，後果更為嚴重。一般的副作用均屬輕微，並會隨身體的適應而逐漸減退。若副作用持續影響日常生活或情況惡化，便需告知醫生或藥劑師，以便作出跟進。

❌ 醫生要我同時使用兩種降膽固醇藥，但我認為只需用一種便足夠。

✅ 因應每個病人的病情及對藥物的反應，用藥的種類及劑量亦有所不同。大部份患者只需使用一種降膽固醇藥，但少數患者則需要使用多於一種。病人切勿自行停藥，以免影響療效。

❌ 沒有感到身體不適，故可自行減少劑量或停藥。

✅ 膽固醇的積聚是沒有任何徵兆的。到血管已變得非常狹窄而出現徵兆的時候，病情已比較嚴重。故此千萬不要單憑病徵來自行調校藥物劑量，以免耽誤病情。

膽固醇含量知多少

食物	一般食 用量	膽固醇 (毫克)	脂肪 (克)	卡路里
白飯	1碗	0	0.5	220
炒飯	1碗	61	18	464
叉燒飯	1碗	44	14	574
排骨飯	1盅	64	13	535
白麵包	1片	0.5	1.8	134
菠蘿包	1個	17	7	235
雞尾包	1個	17	7.5	221
即食麵	1個	**	14.2	424
雲吞麵	1碗	**	10.5	283
乾炒牛河	1碟	50	101	1237
植物油	1茶匙	0	4.5	40
牛油	1茶匙	11	4	36
沙律醬	1茶匙	2	3.7	33
瘦肉	1兩(生)	22	2.4	57
一般魚類	2兩	80	3	80
魷魚	1尾	350	2	138
中蝦	6隻	109	1	76
帶子	1隻	5	0.1	12
雞肉腸	1條	46	8.8	116
午餐肉	1片	20	10	110
炸雞翼	1隻	26	7	103
烱蛋	1隻(大)	212	5.3	78
茄汁豆	1湯匙	1	0.2	16
水豆腐	1件	0	3	53
烱菜	3兩	0	0	28
炒菜	3兩	0	6.8	88
橙	1個(中)	0	0.2	58

食物	一般食 用量	膽固醇 (毫克)	脂肪 (克)	卡路里
蘋果	1個(中)	0	0.5	89
紙包果汁飲品	250毫升	0	0.1	127
汽水	355毫升	0	0	151
荳奶	250毫升	0	7.4	169
脫脂奶	250毫升	5	0.5	90
咖啡/奶茶	1杯	5	1	52
啤酒	355毫升	0	0	147
老火湯	1碗	**	4	50
蝦餃	1粒	**	2.9	37
燒賣	1粒	6	3.5	42
牛肉腸粉	1條	8	2.3	79
叉燒包	1個	**	2.9	94
蓮蓉包	1個	1	1.1	118
芋角	1隻	3	9.9	113
漢堡包	1個	30	10	270
魚柳包	1個	50	18	370
意大利薄餅	1片	30	15	311
薯條	1包(細)	0	10	210
西多士	1客	119	15	379
蛋撻	1件	67	12	209
西餅	1件	66	6	116
曲奇餅	1塊	0	1.6	34
梳打餅	1長片	0	0.7	26

(資料來源：衛生署家庭健康服務)
** 代表膽固醇資料不詳

❓ 如有疑問，

請向你的醫生、藥劑師或有關的醫護人員

查詢。

心臟科藥物之 降膽固醇藥



藥劑職系及服務統籌委員會
COC-Grade (Pharmaceutical Services)



醫院管理局
HOSPITAL
AUTHORITY

甚麼是膽固醇



膽固醇是一種脂肪性物質，主要是由肝臟製造或從食物中攝取。在一般情況下，人體會自行調節體內的膽固醇含量至正常水平。當此調節失效，又或者進食過多含高膽固醇的食物，便可能出現膽固醇過高的情況。

膽固醇對身體十分重要，它是構成細胞膜及製造賀爾蒙和膽液不可缺少的物質，但過多的膽固醇會對人體有害，並會積聚在血管壁上，經過長年的累積使血管硬化、變窄，甚至閉塞而導致心血管疾病。最常見的是心臟冠狀動脈阻塞，形成冠心病，引致心絞痛、心臟病發，甚至突然死亡。此外，吸煙、糖尿病及高血壓都會加速膽固醇的積聚，引致冠心病的形成。故此，保持膽固醇、血壓及血糖於理想水平是減低患心血管疾病的重要因素。想知道血液中的膽固醇含量是否過高，可從驗血得知。

此外，控制血脂蛋白的含量亦同樣重要。血脂蛋白主要負責運送膽固醇到全身，它有「好」與「壞」之分。「好」的血脂蛋白稱為高密度脂蛋白（HDL），有保護血管的作用，故此血液中含量愈高愈好。而「壞」的血脂蛋白包括低密度脂蛋白（LDL）、極低密度脂蛋白（VLDL）等，這些血脂蛋白會令膽固醇積聚於血管內，增加患心血管病的風險，故需減低。

控制膽固醇水平 可減低患心血管疾病的機會。

一般而言，治療膽固醇過高會先在上生活上作調適，若膽固醇控制仍未如理想，才輔以藥物治療。

生活上要注意的事項

- 定期量度血壓、血脂及血糖。
- 均衡飲食，少吃含高鹽、高脂、高膽固醇的食物，多吃蔬菜及水果。
- 戒煙及少飲酒。
- 定時做適量運動。
- 保持適當體重，過重人士應注意體重控制。
- 充份休息，避免過勞，保持心境開朗。

服藥應注意的事項

- 按指示定時用藥，切勿擅自停藥或更改藥物劑量或用藥次數。
- 儘量在每天同一時間用藥。
- 如果曾對藥物有過敏反應，請先向醫生或藥劑師查詢。
- 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
- 未經醫生或藥劑師指示，切勿隨便使用其他藥物，包括保健產品、中藥、中成藥或西藥。
- 將用藥上的困難告知醫生或藥劑師，讓他們了解你的情況，以便作出跟進。
- 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。

認識降膽固醇藥

藥類	常見副作用	注意事項
他汀類 Atorvastatin, Rosuvastatin, Simvastatin	頭痛、胃部不適、肌肉疼痛	※ Simvastatin 應在晚餐後服用。 ※ 懷孕或餵哺母乳的婦女切勿服用。 ※ 服藥期間如發現有原因不明的肌肉疼痛或虛弱無力、食慾不振、噁心、嘔吐、尿液顏色變深、皮膚或眼白變黃等症狀，請立即求醫。 ※ 服用 Simvastatin 期間應避免進食西柚或飲用西柚汁。
微纖維酸類 Fenofibrate, Gemfibrozil	嚴重胃痛、紅疹	※ Fenofibrate: 用水吞服，勿咬碎。 ※ Gemfibrozil: 餐前 30 分鐘口服。 ※ 若發現有原因不明的肌肉疼痛或虛弱無力，應立即求醫。
膽固醇吸收抑制劑 Ezetimibe	頭痛、疲倦、腹痛、胃部不適、胃氣脹、噁心	
膽酸解松脂 Cholestyramine	便秘、胃氣或腹脹、胃部不適	※ 切勿乾服，必須與流質混和同服。與果汁混和會更易入口。 ※ 多吃高纖維食物（如蔬菜）及多喝飲料可減輕副作用。 ※ 此藥可能會影響其他藥物的吸收，應在服用此藥 1 小時前或 4 小時後才服用其他藥物。
PCSK9 抑制劑 Alirocumab, Evolocumab	注射部位反應（發紅、疼痛、瘀青）、感冒、鼻和咽喉發炎、上呼吸道感染、肌肉疼痛、噁心	※ 存放於雪櫃內；藥物需要遮光。 ※ 只可作皮下注射用。 ※ 開啟後未用的劑量勿再使用。 ※ 不可搖勻。

※ 用藥後如有嗜睡、暈眩或視力模糊等副作用，切勿駕駛或從事需高警覺性的工作。避免飲酒，因酒精可加強此等副作用。
※ 若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚痕癢、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

忘記用藥處理方法

應儘快補用適量的劑量。若記起時已接近使用下一劑量的時間，便不必補用，只需依時使用下一劑量。

切勿使用雙倍的劑量。

貯存藥物須知

- 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。
- 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
- 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
- 切勿與他人共用藥物。