

## 使用方法

7. 使用後用水清潔及風乾筒身和推杆。



## 注意事項

1. 若口服餵藥器上的刻度變得模糊，必須更換。
2. 病人如有需要，可向醫護人員進一步查詢口服餵藥器的相關資料。
3. 為免交叉感染，請勿與他人共用口服餵藥器。



此病人資訊單張是由醫院管理局（醫管局）編輯而成，純粹用作一般教育和參考用途。醫管局致力確保該等資訊的準確性，但並不保證該等資訊的完整性、及時性或適用性；或不保證資訊是最為更新的。醫管局並不保證所提供的資訊符合你的健康或醫療需要。如果你有任何健康問題，應向你的醫生或藥劑師諮詢，而不應只依賴此單張所提供的資訊。

S/N: 036Cv5 (10/2024)

# 口服餵藥器



藥劑職系及服務統籌委員會  
COC-Grade (Pharmaceutical Services)




醫院管理局  
HOSPITAL  
AUTHORITY



## 什麼是口服餵藥器？

口服餵藥器是用作準確量度藥液劑量的工具。




### 使用方法

1. 使用前先清洗雙手。
2. 將口服餵藥器筒咀放入藥液內。



3. 拉起推杆，抽取適當份量的藥液。



4. 檢查口服餵藥器內沒有多餘氣泡。



5. 將口服餵藥器筒咀部分放在面頰與牙齦之間。



6. 緩慢地按下推杆，讓病人自然吞服藥液，切勿用力地將藥液直接注入喉嚨，以免引致哽咽甚至窒息。