注意事項

8. 一旦發現頭蝨，患者的家庭成員及其緊密接觸者，也均需求醫接受檢查。
9. 切勿與他人共用藥物。
10. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
11. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。

可能出現的副作用

常見的副作用包括頭皮痕癢、紅腫、出疹、結膜炎（如與眼睛接觸）等。

若於使用藥物後皮膚受到過分刺激或出現過敏反應如皮膚痕癢、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。

此病人資訊單張是由醫院管理局（醫管局）編輯而成，純粹用作一般教育和參考用途。醫管局致力確保該等資訊的準確性，但並不保證該等資訊的完整性、及時性或適用性；或不保證資訊是最為更新的。醫管局並不保證所提供的資訊符合你的健康或醫療需要。如你有任何健康問題，應向你的醫生或藥劑師諮詢，而不應只依賴此單張所提供的資訊。

S/N: 037Cv6 (10/2024)

氯菊酯（百滅寧）藥液 1%（頭蝨用）

藥劑職系及服務統籌委員會
COC-Grade (Pharmaceutical Services)

醫院管理局
HOSPITAL AUTHORITY

什麼是氯菊酯藥液？

氯菊酯藥液是用來塗抹於頭髮和頭皮上，以消滅寄生在髮根上的頭蝨及其卵子。

什麼是頭蝨？

頭蝨是一種只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲，常見於頭髮，特別是耳背或頸後近領口的毛髮。頭蝨卵一般為白、黃、褐或灰色，表面光亮，呈橢圓形，並緊附在髮幹上，若仔細檢驗，可在患者髮根發現。病徵多為頭皮痕癢。過度搔抓或會令頭皮出血或損傷，增加皮膚感染的風險。

頭蝨主要是透過頭部與受感染者的頭部直接接觸而傳播；亦可透過與患者共用個人物品而受感染。因此切勿與他人共用梳子、帽子、頭飾、毛巾和枕頭等個人物品。

建議保持個人衛生，並應經常徹底清潔頭髮和清洗床上用品及衣物。

使用方法

1. 用不含護髮素的洗髮水清洗頭髮。
2. 用水沖洗乾淨，然後用毛巾拭擦，保持頭髮少許濕潤。
3. 將頭蝨藥液搖勻並塗於頭髮上，並在頭皮上用力搓揉，以確保藥液能覆蓋所有頭髮、頭皮，應特別注意髮根、後頸、兩邊髮鬢、瀏海及耳背等地方。
4. 保留藥液在頭髮上 10 分鐘，然後用暖水沖洗，再用毛巾擦乾頭髮。
5. 用除蝨梳徹底從仍濕的髮根梳起，把依附在頭髮上的蝨及卵全部梳走。
6. 治療後的 2–3 週內，每 2–3 天使用除蝨梳檢查頭髮是否仍有活蝨，直至確定再沒有頭蝨為止。
7. 頭蝨藥液經清洗後，切勿於一至兩天內清洗頭髮。
8. 如需要重複塗搽頭蝨藥液，請依照醫生指示或藥物包裝說明使用。

注意事項

1. 只供外用。如不慎誤服，請立即求醫。
2. 依照醫生指示使用藥物。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
5. 塗抹頭蝨藥液時，宜先戴上即棄手套，以免皮膚受到刺激。使用頭蝨藥液後，應清洗雙手。
6. 切勿讓頭蝨藥液沾及眼睛。如不慎入眼，應立即以大量清水沖洗。如有需要，請立即求醫。
7. 患者在療程前使用過的帽子、毛巾、枕袋、被褥和衣服等必須與其他家人或院友的物品分開清洗，並應以攝氏 60 度或以上熱水洗濯不少於 10 分鐘，方可再用。梳頭用具或不耐熱物品可用 1:1 漂白水浸泡 30 分鐘。難以清洗的物品，如枕頭、床褥等，可放入膠袋後密封最少 14 日，才如常使用。