

## 注意事項

1. 只供陰道用。切勿吞服。
2. 依照醫生指示使用藥物。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，使用前請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 建議於睡前使用栓劑。
5. 必須按指示完成整個療程。即使經期開始，仍須繼續用藥，不可中斷。
6. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
7. 切勿與他人共用藥物。
8. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
9. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。
10. 栓劑會於體溫下融化，用藥期間可能有藥液自陰道流出，建議使用衛生巾，以免沾污衣物。

## 可能出現的副作用

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚敏感、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

## 忘記用藥處理方法

應儘快補用適量的劑量，若記起時已接近使用下一劑量的時間，便不必補用，只需依時使用下一劑量。

切勿使用雙倍的劑量。


## 貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。



此病人資訊單張是由醫院管理局（醫管局）編輯而成，純粹用作一般教育和參考用途。醫管局致力確保該等資訊的準確性，但並不保證該等資訊的完整性、及時性或適用性；或不保證資訊是最為更新的。醫管局並不保證所提供的資訊符合你的健康或醫療需要。如你有任何健康問題，應向你的醫生或藥劑師諮詢，而不應只依賴此單張所提供的資訊。

# 陰道栓劑 (陰道藥片)



## ? 甚麼是陰道栓劑？

陰道栓劑是一種用於陰道內的藥物劑型。




## ! 用途

陰道栓劑常用於治理陰道感染。


## 使用方法

1. 徹底清潔雙手。
2. 除去栓劑外的包裝。
3. 仰臥床上，曲起雙膝，張開雙腳，使栓劑較易放入。




## 如有投藥器 (注意：懷孕期間，切勿使用投藥器。)


4. 將投藥器的活塞拉出，並將栓劑放入投藥器內。



5. 小心地把投藥器輕輕放入陰道深處。



6. 輕力按下活塞，把栓劑釋放在陰道內，然後將投藥器整個拉出。



7. 如每次須使用兩片栓劑，請重覆以上步驟。
8. 保持臥姿，以防栓劑掉出。
9. 將活塞由投藥器抽出，用暖肥皂水將投藥器和活塞清洗，然後弄乾。最後清潔雙手。



## 如沒有投藥器

4. 可用手指將栓劑小心地放入陰道深處。
5. 如每次須使用兩片栓劑，請重覆以上步驟。
6. 保持臥姿，以防栓劑掉出。
7. 最後清潔雙手。