

可能出現的副作用

常見的副作用包括皮膚乾燥、痕癢、刺痛等。

短期使用副作用較少，如長期大量使用，可引致皮膚變薄。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚敏感、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

忘記用藥處理方法

應儘快補用適量的劑量，若記起時已接近使用下一劑量的時間，便不必補用，只需依時使用下一劑量。

切勿使用雙倍的劑量。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。




如有疑問，

請向你的醫生、藥劑師或有關的醫護人員

查詢。

S/N: 042Cv2 (10/2017)

外用類固醇藥物



藥劑職系及服務統籌委員會
COC-Grade (Pharmaceutical Services)



醫院管理局
HOSPITAL
AUTHORITY



什麼是外用類固醇？

外用類固醇是指塗於皮膚表面的類固醇製劑，常用於皮膚過敏和發炎等病症。外用類固醇有不同的劑型，如乳液、乳膏及軟膏等。



用途

外用類固醇藥物適用於治療皮膚病，例如濕疹、過敏性皮膚炎及牛皮癬等。



藥理作用

外用類固醇可按照其抗炎效能分為溫和、中度、強效及特強四類。

類固醇能控制致炎物質的產生，紓緩痕癢及發炎症狀。

使用方法

1. 先清潔並抹乾雙手及皮膚患處。
2. 然後將藥物薄薄地搽於患處。

此份量一般已足夠
塗搽一整隻成人
的手。



3. 除非藥物用於治療手部患處，否則使用後應洗淨雙手。

注意事項

1. 只供外用。
2. 依照醫生指示使用藥物。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
5. 切勿與他人共用藥物。
6. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
7. 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。
8. 治理期間，切勿抓破患處，以免導致皮膚損傷而造成感染。
9. 接觸性皮膚炎患者應避免接觸刺激性物質及致敏原（如能辨認），例如清潔劑、化學物質及飾物。
10. 外用類固醇亦會經皮膚吸收，切勿塗搽過多份量或塗搽於傷口，以免藥物被過量吸收而產生副作用。
11. 除醫生指示，毋須使用繃帶包紮或遮蓋患處。