

注意事項

- 由於疥瘡的潛伏期可達數星期，患者各家庭成員及護理員亦應接受檢查。
- 即使成功清除疥瘡，痕癢仍可能持續 4 星期。但如果病徵持續或皮膚出現其他變化，應立即求醫。
- 避免接觸眼睛。如乳劑不慎入眼，應立即以大量清水沖洗。如有需要，請立即求醫。
- 請勿在熱水沐浴後立即使用乳劑。
- 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
- 切勿與他人共用藥物。
- 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
- 用藥後如果情況持續或惡化，應立即求醫。
- 除醫生特別指示外（例如病情較嚴重的挪威型疥瘡或結痂型疥瘡），或在一般情況下，塗敷乳劑一次便已足夠。

可能出現的副作用

常見的副作用包括瘙癢、皮膚紅腫、接觸性皮炎等。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚敏感、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

忘記用藥處理方法

應儘快補用適當的劑量，如持續有疥瘡徵狀應及早求醫。

貯存藥物須知

- 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
- 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。



如有疑問，

請向你的醫生、藥劑師或有關的醫護人員

查詢。

氯菊酯（百滅寧） 乳劑 5%（疥瘡用） Permethrin Lotion 5% (for Scabies)





什麼是氯菊酯乳劑？

氯菊酯乳劑是用於皮膚以治療疥瘡的外用藥物。



什麼是疥瘡？

疥瘡是疥蟎蟲引起的皮膚病。疥蟎是一種寄生蟲，會鑽入人體皮膚寄居及繁殖。疥瘡通常透過直接接觸患者的皮膚而傳播。患者的衣物和被服亦可能帶有疥蟎及蟲卵，繼而傳播此病。在家庭成員之間和院舍機構內傳播亦很常見。

患者會感到非常痕癢，在晚間或沐浴後尤為嚴重。受影響的部位包括手指罅隙的皮膚、手腕、肘部、腋窩、乳頭、下腹、外生殖器官、臀部及腹股溝等部位的皮膚褶。皮膚表面可能會出現紅疹、線狀損痕或小水泡；面部及頭皮一般不受影響。

使用方法

1. 於晚上使用，先以溫水沐浴，再抹乾全身。
2. 將乳劑搖勻。
3. 將乳劑由頸部開始往下，塗遍全身，尤其是皮膚摺疊位置，例如手指、腳趾縫間、腋下及腹股溝。避免接觸傷口及敏感部位。
4. 如疥瘡伸延至頸部以上，則可將乳劑塗遍全身，並包括頭皮、面部及雙耳。避免接觸眼睛。
5. 待乳劑乾後，毋須洗手，並穿上清潔衣服。
6. 待 8 至 14 小時後，用溫水及肥皂徹底沖淨乳劑，並用毛巾抹乾及換上清潔衣服。



如有需要，

請讓家人或他人協助使用乳劑。
協助他人使用時，應先戴上即棄手套。

注意事項

1. 只供外用。如有需要，可用排筆協助塗藥。
2. 依照醫生指示使用藥物。
3. 如果曾對藥物有過敏反應，請先向醫生或藥劑師查詢。
4. 治療期間，每次洗手後必須重塗乳劑。
5. 患者的衣物、床單、被鋪、枕袋等須與其他家人或院友的物品分開清洗，並應以攝氏 60 度或以上的熱水洗濯不少於 10 分鐘，以消滅疥蟲及其蟲卵。難以清洗的衣物和被褥，如鞋、床褥等，可放入膠袋後封密，擱置最少 14 日後，方可使用。

攝氏 **60°** 或以上

不少於
10 分鐘



最少 **14** 天