

噁心、嘔吐及減低食慾

如何處理？

- 少食多餐，保持均衡的營養飲食。
- 避免味道太濃的食物。
- 多飲流質，注意補充水份。
- 需要時服食醫生處方的止嘔藥。

肚瀉

如何處理？

- 多飲流質，注意補充水份。
- 避免進食肥膩、辛辣、奶類製品和高纖維食物（如水果、蔬菜、麥包、消化餅）。
- 需要時按指示服食醫生處方的止瀉藥。

肌肉疼痛

如何處理？

- 適當舒展運動，避免過份操勞。

疲倦

如何處理？

- 避免駕駛或操作機器。
- 均衡作息。

皮疹、皮膚乾燥、痕癢

如何處理？

- 穿着鬆身、綿質衣物。
- 使用保濕潤膚膏、潤膚霜。
- 避免被陽光直接照射，外出時可使用防曬霜或戴帽。

其他常見的副作用包括頭痛、咳嗽及氣促等。

若副作用反應持續或惡化，請儘快聯絡醫生。
若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚敏感、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

潛在的藥物相互作用

1. 如正在服用其他藥物，請先告知醫生或藥劑師。
2. 有些藥物會與達沙替尼產生相互作用，尤其是：
 - 抗真菌藥，例如 ketoconazole
 - 抗生素，例如 clarithromycin
 - 抗結核菌藥，例如 rifampicin
 - 抗腦癇藥，例如 phenytoin、carbamazepine 和 phenobarbitone
 - 胃藥，例如 pantoprazole、famotidine 和 aluminium / magnesium hydroxide

忘記用藥處理方法

- 如距離原定用藥的時間少於 12 小時，請儘快補服，並依照原定時間服用下一劑量。
- 如距離原定用藥的時間超過 12 小時，切勿補服，只需按照平常的用藥時間服用下一劑量。
- 切勿使用雙倍的劑量。
- 於覆診時，向醫生告知任何錯過的劑量。

貯存藥物須知

1. 把藥物存放在孩童不能觸及的地方。
2. 把藥物存放在陰涼乾爽的地方，避光保存。

如有疑問，請向你的醫生、藥劑師或護士查詢。

口服標靶藥物

病人須知

達沙替尼

Dasatinib

什麼是達沙替尼?

達沙替尼屬於口服導向治療(或稱標靶治療)·達沙替尼是透過抑制癌細胞中獨有的蛋白酶(統稱為酪氨酸激酶 tyrosine kinase)從而阻止癌細胞生長,並導致它們死亡。

大部份(90-95%)慢性粒細胞白血病(chronic myeloid leukaemia, CML)病人的染色體出現病變,產生異常的「費城染色體」(Philadelphia chromosome)。「費城染色體」制造結構及功能反常的蛋白酶令白血球細胞不正常生長而引致 CML。達沙替尼能抑制「費城染色體」發出錯誤信息,遏止不正常白血球的產生。

用途

達沙替尼主要用於慢性粒細胞白血病(CML)。除 CML 外,達沙替尼亦能用於治療其他病症如急性淋巴細胞性白血病(acute lymphoblastic leukaemia)等,詳情請向醫生或藥劑師查詢。

使用方法

- 請於每天相同時間服用。
- 空肚或於餐前,餐後服用皆可。
- 請用水吞服整粒藥物。
- 如出現腸胃不適,可於進餐時服或配合一大杯清水送服。
- 在服用達沙替尼的兩個小時前至兩個小時後,請勿服用中和胃酸藥。
- 治療期間,避免食用西柚或飲用西柚汁。
- 請將出現的副作用告訴醫生。醫生可能會根據出現的副作用改變藥物的劑量。

注意事項

1. 依照醫生指示使用藥物。
2. 如果曾對藥物有過敏反應,請先向醫生或藥劑師查詢。
3. 過期或完成療程後剩餘之藥物應立即棄掉。
4. 切勿與他人共用藥物。
5. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。服藥期間切勿餵哺母乳。
6. 用藥後如果情況持續或惡化,應立即求醫。
7. 懷孕婦女請勿觸摸藥物。
8. 觸摸藥物後請洗手。
9. 如需在治療過程中使用非處方藥物、中藥、草藥或接種疫苗,請先向醫生或藥劑師查詢。
10. 療程期間,可維持正常的性生活,但建議採用障礙性的避孕方法(如安全套)。若懷疑懷孕,請即通知醫生。

可能出現的副作用及處理方法

常見副作用
增加感染風險
如何處理?
<ul style="list-style-type: none"> ● 勤洗手,保持個人衛生。 ● 避免到人煙稠密的地方及親近有傳染病的人。 ● 避免進食未經煮熟的食物。 ● 如有發燒(口探體溫達攝氏 38 度/華氏 100 度)、發冷、咳嗽、小便疼痛等感染症狀,請立即求醫。

心臟功能受損
如何處理?
<ul style="list-style-type: none"> ● 醫生會為你定時進行心電圖以監察心臟功能。
增加流血風險
如何處理?
<ul style="list-style-type: none"> ● 避免令身體受傷。 ● 保持大便暢通。 ● 使用軟毛牙刷刷牙,從而減少流牙血的機會。 ● 如有原因不明的瘀傷或流血,如流鼻血、流牙血、皮膚上出現血點或紅疹、吐血、大小便帶血,請儘快聯絡醫生。
水腫(腳腫及面部浮腫等)
如何處理?
<ul style="list-style-type: none"> ● 如果你的體重原因不明地迅速增加,請通知你的醫生。 ● 如果你的腳或小腿有浮腫:坐位時抬高你的腳,及避免緊身衣服。 ● 如果症狀加重,醫生可能會處方利尿劑,以幫助改善你的情況。