



醫院管理局
HOSPITAL
AUTHORITY



衛生防護中心
Centre for Health Protection
Infection Control Branch
感染控制處

給等候 2019 冠狀病毒病測試結果的非留院人士之感染控制建議 (更新於二零二零年二月十八日)

前言

本建議適用於在普通科門診及急症室出現發燒和輕微呼吸道症狀，且無 2019 冠狀病毒流行病學聯繫的非留院人士。此類病人在等待新型冠狀病毒測試（深喉唾液樣本）結果時可返回住所，並不需要住院。

病人離開診所時的建議

- (a) 由於閣下出現呼吸道感染病徵，建議求診後仍需佩戴外科口罩。
- (b) 盡快返回家中休息，避免外出。
- (c) 時刻保持手部衛生。

病人在家中的建議

- (a) 留在家中休息；在病情好轉前，盡可能與家人保持距離，避免親密接觸。
- (b) 避免與其他家庭成員共享私人物品或一起用餐。
- (c) 經常潔手及遵守咳嗽禮儀。
- (d) 盡量留在通風良好的單人房。如可行的話，其他家庭成員則留在不同的房間。
- (e) 打開窗戶以確保共用空間維持良好的通風。
- (f) 減少照顧病者人數，照顧時需佩戴口罩，並經常潔手。
- (g) 每日用 1 比 99 稀釋家用漂白水（以 10 毫升 5.25%次氯酸鈉家用漂白水混和於 990 毫升清水內）進行清潔消毒，待 15 至 30 分鐘後，再用清水清洗。金屬表面則可用 70%火酒清潔消毒。
- (h) 當物品表面或地面被呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物污染時，應先用吸水力強的即棄抹巾清除可見的污垢，然後再用消毒劑清潔消毒受污染及附近的地方。非金屬表面可用 1 比 49 稀釋家用漂白水（以 10 毫升含 5.25%次氯酸鈉漂白水混和於 490 毫升清水內）作清潔消毒，待 15 至 30 分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用 70%火酒清潔消毒。
- (i) 如病人的健康狀況在等候測試結果期間惡化，應戴上外科口罩，並到就近的急症室求診。有需要時可呼召救護車。
- (j) 如有家庭成員出現發燒或呼吸道感染症狀，應佩戴外科口罩，立即求醫。

如廁時的注意事項

- (a) 沖廁前先蓋好廁板，以減少病菌散播。
- (b) 如廁後務必要以梘液和水洗手。